

## ORAL\_02

### POTÊNCIA ANALGÉSICA: 2/5

**METAMIZOL po + PARACETAMOL po**

Indicações possíveis:  
Descontinuação de terapêutica analgésica  
Doentes com alta no dia seguinte

#### **Analgesia**

- 575 mg (1 cápsula) de **METAMIZOL MAGNÉSICO**, de 8/8 horas;
- 1 grama de **PARACETAMOL** (1 comprimido), de 8/8 horas, em esquema cronológico de alternância com o metamizol magnésico.

#### **INSTRUÇÕES ACESSÓRIAS**

- Se o doente apresentar dor, chamar o anestesista de serviço (**Tel: 4151**).
- Este protocolo é **válido por 48 horas** após o que é suspenso;
- Se o doente se mantiver com dor, ou surgir qualquer outra intercorrência, deverá ser chamado o anestesista que a instituiu ou, em alternativa, o anestesista do serviço de urgência (**Tel: 4151**);

#### **VIGILÂNCIA**

**Registar a avaliação da dor de 8/8 horas** (uma vez por turno de enfermeiros);

#### **CARACTERIZAÇÃO DOS FÁRMACOS DESTE PROTOCOLO:**

**PARACETAMOL:** Analgésico antipirético não-opióide, de acção central.

**METAMIZOL:** Analgésico antipirético não-opióide, de acção periférica, com características espasmolíticas e fraca actividade anti-inflamatória.